

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Xλ1(a)

ΤΑΞΗ: Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Ημερομηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1. γ
- A2. α
- A3. α
- A4. β
- A5. δ
- A6. a) Λ
b) Σ
c) Σ
d) Σ
e) Α

ΘΕΜΑ Β


- B1. a)

1^η Α : K (1)
2^η Β : K (2), L (8), M (8), N (2)
17^η Γ : K (2), L (8), M (7)

1^η ομάδα (I_A), 1^η περίοδος
2^η ομάδα (II_A), 4^η περίοδος
17^η ομάδα (VII_A), 3^η περίοδος

- β)


i) Ανάμεσα στα στοιχεία Α και Γ θα σχηματιστεί ομοιοπολικός δεσμός καθώς και το Α και το Γ θέλουν να αποκτήσουν από 1 ε⁻ το καθένα άρα θα υπάρξει κοινή συνεισφορά.




ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Xλ1(a)

- ii) Ανάμεσα στα στοιχεία Β και Γ θα σχηματιστεί ετεροπολικός δεσμός καθώς το Β θέλει να αποβάλλει 2 e^- και το Γ θέλει να αποκτήσει 1 e^- άρα θα υπάρξει μεταφορά των 2 e^- από το Β σε 2 διαφορετικά άτομα Γ.



- iii) Ανάμεσα στα στοιχεία Β και Α θα σχηματιστεί ετεροπολικός δεσμός καθώς το Β θέλει να αποβάλλει 2 e^- και το Α θέλει να αποκτήσει 1 e^- άρα θα υπάρξει μεταφορά των 2 e^- από το Β σε 2 διαφορετικά άτομα Α.



- γ) Το στοιχείο Β έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το στοιχείο Γ καθώς βρίσκεται πιο αριστερά κατά μήκος του Π.Π. και γνωρίζουμε ότι η ατομική ακτίνα αυξάνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά.

B2.

Όνομασία	Μοριακός Τύπος	Κατηγορία
Υδροκεντρίο	HCN	Οξύ
Υδροξείδιο του βαρίου	$Ba(OH)_2$	Βάση
Φωσφορικό νάτριο	Na_3PO_4	Άλας
Θειικό αμμώνιο	$(NH_4)_2SO_4$	Άλας
Νιτρικό οξύ	HNO_3	Οξύ
Ιωδιούχος Μόλυβδος	PbI_2	Άλας
Πεντοξείδιο του αζώτου	N_2O_5	Οξείδιο
Υδροξείδιο του αργιλίου	$Al(OH)_3$	Βάση
Μονοξείδιο του άνθρακα	CO	Οξείδιο

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Xλ1(a)

- B3.
- 1) $2\text{H}_3\text{PO}_4 + 3\text{Ba}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
 - 2) $\text{Cl}_2 + 2\text{HBr} \rightarrow 2\text{HCl} + \text{Br}_2$
 - 3) $(\text{NH}_4)_2\text{S} + 2\text{KOH} \rightarrow \text{K}_2\text{S} + 2\text{NH}_3 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
 - 4) $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MgSO}_4 + \text{H}_2$
 - 5) $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.

$$n_{\text{CO}_2} = \frac{m}{\text{Mr}} \Rightarrow n_{\text{CO}_2} = \frac{8,8}{44} = 0,2 \text{ mol}$$

$$n_{\text{SO}_2} = \frac{m}{\text{Mr}} \Rightarrow n_{\text{SO}_2} = \frac{19,2}{64} = 0,3 \text{ mol}$$

$$n_{\text{NO}_2} = \frac{m}{\text{Mr}} \Rightarrow n_{\text{NO}_2} = \frac{23}{46} = 0,5 \text{ mol}$$

$$P \cdot V = n_{\text{oλ}} \cdot R \cdot T \Rightarrow P = \frac{1 \text{ mol} \cdot 300 \text{ K} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}{24,6 \text{ L}} \Rightarrow P = 1 \text{ atm}$$

$$n_{\text{oλ}} = 0,2 + 0,3 + 0,5 = 1 \text{ mol}$$

Γ2.

a) $n = \frac{V}{V_m} = \frac{4,48}{22,4} = 0,2 \text{ mol}$

β)

1 mol NH_3 περιέχει $3N_A$ áτομα H

0,2 mol περιέχουν $0,6N_A$ áτομα H

γ)

1 mol NH_3 περιέχει N_A μόρια NH_3

0,2 mol περιέχουν $0,2N_A$ μόρια NH_3

Γ4.

$$n = \frac{m}{\text{Mr}} \Rightarrow \text{Mr} = \frac{m}{n} = \frac{17}{0,5} = 34$$


$$\text{Mr}_{\text{B}_x\text{A}} = \text{Ar}_B \cdot x + \text{Ar}_A \Rightarrow 34 = 1 \cdot x + 32 \Rightarrow x = 2$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε 100ml δ/τος περιέχονται 0,98g H₂SO₄

$$n_A = \frac{m}{Mr} = \frac{0,98}{98} \Rightarrow n_A = 0,01 \text{ mol} \quad \text{και} \quad C_A = \frac{n_A}{V_A} = \frac{0,01}{0,1} \Rightarrow C_A = 0,1 \text{ M}$$

Δ2.



Παρατηρούμε ότι έχουμε αγάπητη διάλυμάτων ίδιας διαλυμένης ουσίας H₂SO₄, άρα θα ισχύει η σχέση ανάμειξης διάλυμάτων:

$$C_A \cdot V_A + C_B \cdot V_B = C_\Gamma \cdot (V_A + V_B)$$

Μπορούμε να αντικαταστήσουμε πλέον τα δεδομένα μας στη σχέση και να λύσουμε ως προς C_Γ:

$$C_\Gamma = \frac{C_A \cdot V_A + C_B \cdot V_B}{V_A + V_B} = \frac{0,1 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,5}{0,5 + 0,5} \Rightarrow C_\Gamma = 0,2 \text{ M}$$

Δ3. Αφού η συγκέντρωση υποδιπλασιάζεται σημαίνει ότι το αραιωμένο διάλυμα θα έχει συγκέντρωση 0,1 M.
Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο της αραίωσης:


$$C_\Gamma \cdot V_\Gamma = C_r \cdot V_r \Rightarrow V_r = \frac{C_\Gamma \cdot V_\Gamma}{C_r} = \frac{0,2 \cdot 1}{0,1} \Rightarrow V_r = 2L$$

Αφού ο τελικός όγκος είναι 2L σημαίνει ότι πρέπει να προσθέσουμε 1L νερό δηλαδή 1000mL νερό.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β' ΦΑΣΗ

E_3.Xλ1(a)

Δ4.



Στην παραπάνω αντίδραση το x είναι ο αριθμός οξείδωσης του μετάλλου. Άρα αφού προσδιορίσαμε τα moles του μετάλλου μπορούμε να υπολογίσουμε το x :

$$n_M = \frac{m}{Mr} \Rightarrow \frac{0,4}{x} = \frac{9,2}{23} \Rightarrow 9,2x = 9,2 \Rightarrow x = 1$$

Άρα ο αριθμός οξείδωσης του μετάλλου είναι +1.

ΑΡΓΕΝΗ